

Oculoheel

Colirio en solución

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

Contenido del prospecto

1. Qué es Oculoheel Colirio en solución y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Oculoheel Colirio en solución
3. Cómo usar Oculoheel Colirio en solución
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Oculoheel Colirio en solución
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Oculoheel Colirio en solución y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario antes de empezar a tomarlo y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Oculoheel Colirio en solución

No use Oculoheel Colirio en solución

Si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento. Si los síntomas persisten o se agravan

durante la utilización de este medicamento, se deberá consultar con un médico o farmacéutico.

Como este medicamento contiene Echinacea, no lo utilice de forma continuada durante más de 8 semanas sin consultar a su profesional de la salud.

Otros medicamentos y Oculoheel Colirio en solución

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Oculoheel Colirio en solución contiene fosfatos

Este medicamento contiene 2,81 mg de fosfatos en cada envase monodosis equivalente a 6,25 mg/g.

Si sufre de daño grave en la córnea (la capa transparente de la parte frontal del ojo) el tratamiento con fosfatos, en casos muy raros, puede provocar visión borrosa por acumulación de calcio.

Como este medicamento contiene Echinacea, por favor consulte con su profesional de la salud si sufre alguna de las siguientes condiciones: trastornos sistémicos progresivos, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, inmunosupresión y trastornos de los glóbulos blancos.

3. Cómo usar Oculoheel Colirio en solución



Vía oftálmica.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Instrucciones de uso:

- Los envases monodosis están destinados a una aplicación. No abra el envase monodosis hasta justo antes de ser utilizado.
- Separe un envase monodosis girando y tirando de él. Gire para abrir el tapón evitando tocar la abertura.

- Incline la cabeza hacia atrás, mantenga el envase monodosis en posición vertical y apuntando hacia abajo; permitir el goteo desde el envase monodosis de la gota(s) en el saco conjuntival del ojo mediante la aplicación de un poco de presión sobre el envase monodosis desde arriba.
- Extender el medicamento con movimientos del párpado y el ojo.
- Cualquier contenido sobrante debe desecharse.



La dosis recomendada es:

Dosificación estándar:

Adultos y niños de 12 años o más: Instilar 1-2 gotas en el ojo afectado, 4 veces al día, o más veces en caso necesario.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Niños menores de 2 años: Instilar 1-2 gotas en el ojo afectado, 4 veces al día.

Niños entre 2-5 años: Instilar 1-2 gotas en el ojo afectado, 4 veces al día, o más veces en caso necesario.

Niños entre 6-11 años: Instilar 1-2 gotas en el ojo afectado, 4 veces al día, o más veces en caso necesario.

Si usa más Oculoheel Colirio en solución del que debe, hable con su médico o farmacéutico y lleve este prospecto con usted. También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Si olvidó usar Oculoheel Colirio en solución

No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. En casos aislados se han notificado reacciones alérgicas locales transitorias, como erupción o sensación de quemazón.

Se han notificado, de forma muy rara, casos de calcificación corneal asociados al uso de colirios que contienen fosfatos en algunos pacientes con afectación significativa de la córnea.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Oculoheel

Colirio en solución

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja o en el envase monodosis después de CAD/Exp. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Periodo de validez una vez abierto el sobre: 6 meses

Una vez abierto el envase monodosis: uso inmediato.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Oculoheel Colirio en solución

Cada envase monodosis con 0,45 ml de colirio en solución contiene:

- Los principios activos son Euphrasia officinalis D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus jaborandi D5 110,7 mg, Echinacea angustifolia D5 110,7 mg.
- Los demás componentes (excipientes) son cloruro de sodio, dihidrogenofosfato de sodio dihidrato e hidrogenofosfato de sodio dihidrato.

Aspecto del producto y contenido del envase

Oculoheel Colirio en solución es una solución oftálmica transparente e incolora.

Oculoheel Colirio en solución se presenta en caja de cartón conteniendo 15 envases monodosis de polietileno con 0,45 ml de colirio en solución, separados en 3 sobres de PET/ALU/PE con 5 envases monodosis cada uno.

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorios Heel España, S.A.U.

Calle Madroño, s/n

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Teléfono: 918473910, Fax: 918463614

consulta@heel.es

Responsable de la fabricación:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Baden-Baden, Alemania

Fecha de la última revisión de este prospecto:

10/2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).